

TMR – STABIL

Fris voer aan het voederhek !!!

Samen met de omgevingstemperatuur stijgt tijdens de zomermaanden ook het risico op broei van het voer aan het voederhek en in de kuil. Tijdens het mengen van het TMR rantsoen komt er enorm veel zuurstof bij het ruwvoeder. In deze zuurstofrijke omgeving ontwikkelen schimmels zich in een razend tempo, wat tot een hogere temperatuur van het rantsoen leidt. Door de wilde gistvorming is er veel minder energie beschikbaar voor de koeien. Een temperatuurstijging van 15 graden geeft al snel een verlies van 4% aan droge stof. Broei leidt tot minder voederopname en dus tot minder melkproductie of groei.



Het gebruik van organische zuren kan de groei van bacteriën, gisten en schimmels remmen zodat broei kan voorkomen worden. De energiewaarde van het voermengsel blijft zo goed op peil. Daarenboven zorgen bepaalde organische zuren voor een frisse smaak in het voer wat een verhoogde voederopname tot gevolg heeft.

TMR-STABIL is een mengsel van sorbinezuur, calciumpropionaat en zout opgemengd met tarwemeel.

Het is een veilig en gemakkelijk te doseren en in te mengen product.

Op vraag kan het ook ingemengd worden in de krachtvoermengeling die we voor u maken zodat u het niet apart in de mengwagen hoeft te doseren.

Eigenschappen van TMR-STABIL :

- Voorkomt broei aan het voederhek dus meer VEM en DVE beschikbaar voor de koeien
- Stimuleert de voederopname
- Eenvoudig toe te passen
- Niet corrosief
- Ook te gebruiken om de toplaag van de kuilen te behandelen tijdens het inkuilen



Gebruik :

TMR : 2 kg/ton gemengd rantsoen bijvoegen in de mengwagen. Het product toevoegen als er al een deel in de mengwagen aanwezig is, en dat er nog voldoende mengtijd overblijft.

Toplaag bij inkuilen : 0,5 kg/m²

Op vraag inmengen in uw krachtvoermix volgens dagelijkse KV-gift.

Verpakking : Zakken 25 kg (1000 kg/palet)

KEYSERS Veevoeders NV

Zoerselbaan 123 – 2390 Westmalle

Tel 03/312 22 81

contact@keysers-veevoeders.be